

DSHS 13-684C KO (REV. 08/2004)

WELL CHILD EXAM - EARLY

煎	riability to it state			OOD: 4 YEARS EDT Guidelines)				DATE		
	•				유년기	초기	(4세)			
	아동의 이름						고 온 사람		생년월일	
	알레르기 문제					현재 복용하고 있는 약품				
아이가 함께 작성함	지난 방문 이후 질병	병 /사고 /문 제 / የ	염력사항 등					오늘 질문한 사항:		
마 어 어		기는 다른 ^c	다양하게 섭취함 아이들과 잘 어울 [:] 운을 입을 수 있습	립니다.	예 	아니 <u>·</u>		발로 뜀뛰기를 할 <i>-</i> 를 부릅니다.	- 있습니	다.
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE	HEIGHT (CM/IN. PERCENTILE	BLOOD PRE	SSURE					
Re	eview of systems		Review of famil	y history						
Screen Hearing	Sleep									
Vision 9	Screen	2	0/	20/			Nutrition	Child Care	Develo	pment
Develo	pment: Circle ar	ea of cond	ern			Regular Physical Activities Car Safety/ Booster Seat				
	ve/Cognitive		ge/Communication	on			Safety Discipline/Limits/Rules Books/Reading			
Gross	-	al/Emotion	_				-	ing Limit TV/		
Behavi	or	N A					Other:	<u> </u>		
Mental	Health					As	ssessment/Plan			
Physica	al:	N A			N A					
Genera	al appearance		Chest			_				
Skin			Lungs							
Head			Cardiovascula	r/Pulses						
Eyes			Abdomen			_				
Ears			Genitalia							
Nose	/T = =4l=	HH	Spine			_				
Oropna Neck	rynx/Teeth	HH	Extremities							
Nodes		HH	Neurologic Gait							
						_				
Describe abnormal findings and comments:			IMMUNIZATIONS GIVEN							
						REF	ERRALS			
	NEXT VISIT:	5 YEARS	OF AGE			HEA	LTH PROVIDER	NAME		
HEALTH	PROVIDER SIGN	IATURE				HEA	LTH PROVIDER	ADDRESS		

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

SEE DICTATION

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Early Childhood (4 years)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions. They are not comprehensive quidelines.

Fluoride Screen

Fluoride supplements should be considered for all children drinking fluoride deficient (<0.6 ppm F) water. Before supplements are prescribed, it is essential to know the fluoride concentration of the patient's drinking water. Once the fluoride level of the water supply has been evaluated, either through contacting the public health officials or water analysis, as well as evaluating other sources of fluoride, the daily dosage schedule can be recommended. Pediatric Dentistry: Reference Manual 1999--00.(21)5.

Lead Screen

Screen children for these risk factors:

- Live in or frequently visit day care center, preschool, baby sitter's home or other structure built before 1950 that is dilapidated or being renovated.
- Come in contact with other children with known lead toxicity (i.e., blood lead 15 ug/dl).
- Live near a lead processing plant or with parents or household members who work in a lead-related occupation (e.g., battery recycling plant).

Developmental Milestones

Always ask about and follow-up on parent concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, or the MacArthur Communication Development Inventory.

Yes	No	
		Dresses with supervision.
		Plays games with other children (e.g., tag)
		Says what to do when tired, cold, hungry.
		Says first and last name when asked.
		Walks up and down stairs, alternating feet.
		Balances on each foot for 2 seconds.
		Copies a circle.
Ina	ppropr	iate play with toys/no pretend play.

Instructions for developmental milestones: At least 90% of children should achieve <u>the underlined milestones</u> by this age. If you have checked "no" on any two items, on *even one* of the underlined items, or if you have checked the **boxed item** (abnormal behavior at this age), refer the child for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies (1-800-322-2588) with questions or concerns on childhood development.



건강진단 - 유년기 초기 (4세) WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: (El

EARLY CHILDHOOD: 4 YEARS	날짜
PSDT 지침 준수)	

유년기 초기 (4세)						
	아동의 이름	아이를 데리		생년월일		
			Γ			
	알레르기 문제		현재 복용하고 있는 약품			
<u> </u>	 지난 방문 이후 질병/사고/문제/염력사항 등		오늘 질문한 사항:			
₽_						
수 수 수 후						
아 아		-11 -11 1				
ं स	예 아니오	예 아니 <u>:</u>		니크 KIKI기로 참 A 이스티다		
바	│ │ │ │ │ │		아이는 안쪽	발로 뜀뛰기를 할 수 있습니다.		
) JF	아이는 다른 아이들과 잘 어울립니다.		아이는 노래를	를 부릅니다.		
	아이 스스로 옷을 입을 수 있습니다.					
체중 KG./OZ	7. 백분율 신장 CM/IN. 백분율 혈압					
		식	사			
신	체검사 가족병력검토	배	설 (대/소변)			
 검사항·	목: MHZ R L		수면			
청력검			예방접종 기록 검토 납성분 노출			
371			불소보충			
	2000		Hct/Hgb (헤마토크리토/	TB(결핵) 치과의뢰		
	1000		에오글도민)			
	500		보건교육: (의논을 하였거나/제공된 모든 인쇄물에 체크)			
시력검	사 20/ 20/		영양			
발달 ^	사항: 염력하는 부문에 동그라미로 표하십시오.		규칙적인 운동(활동) 카시트/부스터 시트			
적응력	/인식력 언어능력/의사소통		안전 징계/제약/규칙 책/읽기			
대 운동	등근육(신경) 사회적/정서적 사항 소 운동근육(신경	경)	간접흡연	TV/컴퓨터 시간 제한 헬멧		
	정상 비정상					
행동사회		— —	71-1:			
정신건	강	명	가/계획:			
신체:	정상 비정상 정상	비정상				
외모	흥부					
피부	<u> </u>					
머리	심장혈관/맥박					
눈	복부					
귀	생식기					
코	<u></u>					
구강인						
목	□ □ 신경 □					
결절 걸음걸이						
이상 건	ː강에 대한 설명이나 의견:	Od Hr	x1 &			
		예방	입 ㅎ			
		 의뢰				
	다음 방문: 5세	진찰	자 성명			
=121=			-11			
진찰자 서	병	진찰 	자(진료윈) 주소			
DSHS 13-68	4C KO (REV. 08/2004)			구술 참조		

유년기 초기: 4세

4세 아동의 건강

성장 과도기

4세에서 5세 사이 아이의 신체 발욱 범위들

층계를 잘 오르네립니다.

가볍게 뜁니다.

좀 더 긴 문장으로 말합니다.

어제 일어난 일들이나 내일 일어날 일들에 관해 이야기 합니다

손가락으로 셀 수 있습니다.

일부 알파벳을 알아 봅니다.

집주소와 전화번호를 기억합니다.

옷으로 흉내놀이를 합니다.

아이가 세로운 기술을 배우는 데 도움이 되도록 아이와 대화하고 놀아줍니다.

도움이나 상세한 정보를 원할 때

논하기 어려운 문제 등을 주제한 어린이용 서적에 관한 정보:지역의 보건부나 공공도서관의 어린이 도서담당 사서에게 문의할 수 있습니다

아이에게 화재 안전수칙을 가르키는 데 도움을 줄 수 있는 곳: 지역에 있는 소방소의 소방관과 대화를 나눕니다.

양욱기슬과 지원정보: 가족 헬프 전화번호, 1-800-932-HOPE (4673) Family Resources Northwest, 1-888-746-9568 지역 커뮤니티 칼리지 강좌

건강 정보

자녀가 취학하기 전에 일정한 예방접종이 필요합니다. 지금부터 준비하십시오. 특정 백신을 기피할 경우에는 면제 양식에 서명해야 합니다.

매일 적어도 다섯 번은 자녀에게 약간의 과일과 약채를 주십시오. 과일과 약채는 건강식인데다 좋은 간식이 됩니다.

충분한 수면을 취하도록 하면 아이들은 더 행복감을 느끼고 학습 능력도 향상됩니다! 일찍 잠들도록 하여 밤에는 10-12시간 정도 수면을 취하게 하십시오. 잠자리에 드는 시간을 규칙적으로 하면 아이도 그에 순응하게 됩니다. 잠들기 전에 같이 책을 읽거나 대화를 나누십시오.

양육 정보

아이가 화가 났을 때나 슬플 때에 그 이유를 말로 표현하도록 격력해 줍니다. 당신이 직접 행동으로 보이면 아이가 그 방법을 배우게 됩니다.

매일 자녀와 함게 책을 읽고 퍼즐을 풀거나 밖에서 활동적으로 게임을 즐기는 시간을 갖도록 하십시오.

아이들은 자연히 자신의 신체에 호기심을 가지게 됩니다. 간단하고 솔직한 대답을 들으면 아이는 자신의 몸에 아무런 문제가 없다고 느끼게 됩니다. 성기를 가리킬 때는 실제 명칭을 사용하십시오.

안전정보

몸집이 큰 아이에겐 부스터(booster) 카 시트를 사용하십시오! 성인용 좌석 벨트를 착용할 수 있기 전까지는 뒷좌석에 무릎/어깨 벨트가 달린 부스터를 사용하십시오. 곧 부스터가 필요하게 되며 6살 또는 몸무게가 60파운드가 될 때까지 사용합니다.

아이가 집주소와 전화번호를 알고 있도록합니다. 비상시 911에 전화하는 방법을 가르쳐주십시오. 전화로 도움을 요청해야 할 때에는 전화를 끊지 않고 계속 들고 있도록 말해주십시오. 집에서 장난감 전화기로 연습해봅니다

옷에 불이 붙었을 때는 행동을 멈추고 몸을 바닥에 구르도록 가르쳐 주십시오